


INFORMACJA DLA FARMACEUTY



Mometazon Doppelherz

50 mikrogramów/ dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

Mometazon Doppelherz wskazany jest do stosowania u osób dorosłych w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa po wcześniejszym zdiagnozowaniu przez lekarza.

KATAR SIENNY, który występuje w określonych porach w ciągu roku, jest reakcją alergiczną spowodowaną • wdychaniem pyłków drzew, traw, chwastów, a także • zarodników pleśni i grzybów. **Mometazon Doppelherz** zmniejsza obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa i w ten sposób łagodzi objawy spowodowane katarzem siennym, takie jak:

- kichanie,
- swędzenie,
- uczucie zatkanego nosa,
- zmniejsza ilość wydzieliny z nosa.

Ten materiał nie zawiera wszystkich informacji. W celu uzyskania pełnych informacji należy zapoznać się z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL) przed wydaniem produktu leczniczego. Pełny i zaktualizowany tekst ChPL jest dostępny w „Rejestrze Produktów Leczniczych” na stronie www.urpl.gov.pl/pl. Ten materiał edukacyjny został zatwierdzony przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Przedstawiona poniżej informacja dla farmaceutów ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego stosowania produktu leczniczego **Mometazon Doppelherz**:

- Jeśli objawy alergicznego nieżytu nosa pojawiły się po raz pierwszy, należy doradzić pacjentowi, aby zasięgnął porady lekarza. Ma to na celu uniknięcie zamaskowania innej choroby podstawowej, np. astmy.
- Produktu leczniczego **Mometazon Doppelherz** nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, między innymi z powodu ryzyka zahamowania wzrostu.
- Przed zastosowaniem leku pacjent powinien zapoznać się z ulotką dla pacjenta dołączoną do opakowania.

- Należy poinformować pacjenta, że niekiedy złagodzenie objawów występuje po 12 godzinach od podania pierwszej dawki leku, jednak w ciągu pierwszych 48 godzin po podaniu można nie uzyskać pełnego działania produktu leczniczego. Warunkiem skutecznego leczenia jest regularne stosowanie produktu leczniczego.
- Pacjent powinien zwrócić się do lekarza jeśli po 14 dniach stosowania leku objawy nie ustąpią lub nasilą się.
- Właściwy sposób podawania jest istotny w celu uniknięcia miejscowego podrażnienia i perforacji przegrody nosowej: w tym celu należy przechylić głowę lekko do przodu, trzymając butelkę pionowo do góry. Końcówka dozownika powinna być skierowana w stronę nozdrza a nie w kierunku przegrody nosowej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Queisser Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, tel.: + 48 22 487 52 55; e-mail: pv@queisser.pl



Mometazon Doppelherz

50 mikrogramów/ dawkę, aerozol do nosa, zawiesina