



Minister Zdrowia

Wpłynęło da. 2020 -12- 23  
L. dz. 101/2428/2020  
Podpis

Warszawa, 23 grudnia 2020

Pani

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Minister Zdrowia informuje, iż zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych od dnia 1 stycznia 2021 r. objęte refundacją apteczną zostają 3 nowe produkty lecznicze zawierające substancję czynną *Octreotidum* w grupie limitowej: 79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu – oktreatyd:

1. Okteva, *Octreotidum*, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg, 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp., kod EAN: 05909991416461;
2. Okteva, *Octreotidum*, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg, 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp., kod EAN: 05909991416485;
3. Okteva, *Octreotidum*, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg, 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp., kod EAN: 05909991416508.

Tym samym w obwieszczeniu refundacyjnym obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. znajdują się poniższe produkty lecznicze zawierające oktreatyd z następującymi cenami:

Nazwa, postać, dawka, zawartość opakowania	Numer GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Zakres wskazań objętych refundacją	Zakres wskazań pozarejestryjnych objętych refundacją	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml, 5 amp.po 1 ml	05909990042913	43,20	54,49	Akromegalia	<1>hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL; <2>objawy hipersekcji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynych innych niż określone w ChPL	10,33

Ministerstwo Zdrowia  
ul. Miodowa 15  
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 63 49 460  
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl  
www.gov.pl/zdrowie

wiepodlega



Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml, 5 amp.po 1 ml	05909990042715	32,40	39,99	Akromegalia	<1>hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL; <2>objawy hipersekcji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL	19,51
Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg, 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml	05909990459711	2160,00	2303,65	<1>Akromegalia; <2>Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowolająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnio: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma; Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby	<1>hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL; <2>objawy hipersekcji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL	1359,67

<p>Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg, 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml</p>	<p>05909990459612</p>	<p>4320,00</p>	<p>4587,65</p>	<p>&lt;1&gt;Akromegalia; &lt;2&gt;Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadawalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma; Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prąjelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby</p>	<p>&lt;1&gt;hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL; &lt;2&gt;objawy hipersekcji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL</p>	<p>2696,50</p>
<p>Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg, 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml</p>	<p>05909990459513</p>	<p>6480,00</p>	<p>6867,23</p>	<p>&lt;1&gt;Akromegalia; &lt;2&gt;Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadawalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma; Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze</p>	<p>&lt;1&gt;hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL; &lt;2&gt;objawy hipersekcji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL</p>	<p>4030,27</p>

				środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby		
Okteva, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg, 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.	05909991416461	882,00	961,75	Akromegalia; Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowolająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma; Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby	<1>hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL; <2>objawy hipersekcji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL	17,77
Okteva, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg, 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.	05909991416485	1764,00	1903,85	Akromegalia; Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowolająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma; Leczenie pacjentów z	<1>hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL; <2>objawy hipersekcji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL	12,70

				zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby		
Okteva, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg, 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.	05909991416508	2646,00	2841,53	Akromegalia; Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma; Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby	<1>hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL; <2>objawy hipersekcji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL	4,57

W związku z istotnie wyższą dopłatą pacjenta do określonych leków proszę o poinformowanie aptek, aby nie było strat po stronie aptek.

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu

/dokument podpisany elektronicznie/